



## Immunization Record\*\*

AGE	VACCINE	DUE ON	GIVEN ON	WEIGHT	HEIGHT	HEAD	BATCH
Birth	BCG / OPV 0 / Hep - B - 1						
6 Weeks	DTPw/DTPa						
	IPV 1						
	Hep - B - 2						
	HIB - 1						
	Rotavirus 1 <sup>†</sup>						
	Conjugate Pnuemococcal Vaccine 1 <sup>†</sup>						
10 Weeks	DTPw/DTPa						
	IPV 2						
	HIB 2						
	Rotavirus 2 <sup>†</sup>						
	Conjugate Pnuemococcal Vaccine 2 <sup>†</sup>						
14 Weeks	DTPw/DTPa						
	IPV 3						
	HIB-3						
	Rotavirus 3 <sup>†</sup>						
	Conjugate Pnuemococcal Vaccine 3 <sup>†</sup>						
6 months	OPV 1 / Hep - B - 3 / Influenza-1 <sup>†</sup>						
7 months	Influenza-2 <sup>†</sup>						
9 months	Measels / OPV 2 / MMR						
10-12 months	Typhoid Conjugate						
12 months	Hepatitis - A - 1 <sup>†</sup>						
15 months	MMR						
	Chicken Pox 1 <sup>†</sup>						
16 months	Conjugate Pnuemococcal Vaccine <sup>†</sup>						
16-18 months	DTPw/DTPa						
	IPV						
	HIB						
18 months	Hepatitis-A-2 <sup>†</sup>						
2 years	Typhoid						
4 1/2 - 5 years	DTPw/DTPa						
	OPV						
	MMR						
	Chicken Pox - 2 <sup>†</sup>						
	Typhoid Booster (every 3 years)						
10 years	Tdap. / Td.						
	HPV <sup>x</sup>	I					
		II					
		III					
16 years	Td Vac						

<sup>†</sup> एच्.पी.वी. - केवल दस साल से ज्यादा उम्र की लड़कियों (गर्ल चाइल्ड) के लिए ।

**अन्य जानकारीयां**

**बी.सी.जी.** - टीकाकरण के बाद टीका एरिया में हल्की सूजन आ सकती है जो स्वतः एक दाग बनकर ठीक हो जायेगी । इसके लिए कोई इलाज की जरूरत नहीं होती ।

**ओ.पी.वी.** - टीकाकरण के बाद शिशु को स्तनपान कराया जा सकता है ।

**डी.पी.टी.** - टीकाकरण के बाद हल्का दर्द एवं बुखार आ सकता है । इंजेक्शन एरिया में लालिमा के साथ सूजन आ सकती है जो स्वतः ठीक हो जायेगी ।

कोई विशेष लक्षण हो तो डॉक्टर से सलाह लें ।

**मीजल्स या खसरा** - टीकाकरण के बाद कुछ बच्चों को चार से दस दिनों बाद बुखार आ सकता है ।

**रोटावायरस वेक्सीन** के जोज कम्पनी के हिसाब से अलग अलग है ।

**नोट :** अगर बच्चे को कोई टीका दिलाना रह गया हो तो बाद में भी डॉक्टर से सलाह करके दिला सकते हैं ।